



โรคพิษสุนัขบ้า

เคื่อน "หมา-แมว" กัดข่วน รีบพบแพทย์

สาเหตุโรคพิษสุนัขบ้า

เรียกอีกอย่างว่า "โรคกลัวน้ำ" เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า "เรบีส์" (Rabies) สัตว์นำโรคได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด แต่สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย คือ สุนัข แมว การติดเชื้อเกิดจากสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน หรือ ถูกน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผล

อาการของโรค

เริ่มจาก 2-3 วันแรก ผู้ป่วยจะเบื่ออาหาร เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว มีไข้ อ่อนเพลีย ไข้ เจ็บเสียวคันอย่าง รุนแรงที่แผลและลำตัว ต่อมาจะมีอาการกระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำ และกลืนเนื้อขากรดุก แน่นหน้าอก ทายใจไม่ออก หรืออาจชัก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด



วิธีการรักษาเบื้องต้น

หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ ล้างแผลด้วยน้ำ และสบู่หลายๆครั้ง อย่างน้อย 15 นาที

ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น

เบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราเกิดโรค

ห้ามปิดแผลและไปพบแพทย์ กับก็เพื่อรับการรักษาคัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



ระยะเวลาของอาการ

ส่วนใหญ่มักใช้เวลาประมาณ 2-8 สัปดาห์ แต่อาจสั้นเพียงแค่ว่า 7 วันหรือยาวเกินกว่า 1 ปี



เป็นแล้วถึงตายแต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (Pre-exposure Immunization)

ฉีดวัคซีนก่อน การได้รับเชื้อ 3 เข็ม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอายุรกรรมและคลินิกเด็ก



โรงพยาบาล 3 ชั้น
CH3 INTERNATIONAL HOSPITAL

ติดต่อเรา 1609



เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ช่วน ต้องทำดังนี้

1. รีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง 15-20 นาที และ ทำการปฐมพยาบาล เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อโรคตามแผล
2. เจาะล้างฝีให้ถึงไส้ฝืดเมื่อมีบาดแผลบวม/ฝี/ฝีในรูขุมขน 10 วันหลังจากนั้น รีบปรึกษาสัตวแพทย์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3. ไปหาหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการฉีดวัคซีน

คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

1. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้ง 2 ครั้ง
2. ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพามในที่สาธารณะ หากจำเป็นต้องพาสุนัขออกนอกบ้าน ต้องขังสุนัขด้วย
3. ไม่ปล่อยสุนัขไปปล่อย และต้องขังสุนัขไว้ให้เรียบร้อยทุกวัน



"ปีหนึ่งคนมักถูกสุนัขกัด ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน"

เมื่อถูกสัตว์สงสัยป่วย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือช่วน ต้องล้างแผล ใส่ยา ทักหมา 10 วัน และหาหมอ

เว็บไซต์ของกรม สปช

www.nonsaat.kas.go.th

E-mail : nonsa-ard@hotmail.com

www.facebook.com/กรมสัตวแพทย์

ข. สัตวแพทย์ กรม สปช

พญาบุรุษโรตารี ๑๖๖-๑๖๗๗๖ , ๑๖๖-๑๖๗๗๗ โทรสาร ๑๖๖-๑๖๗๗๖



โรคพิษสุนัขบ้า



โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ป่าและสัตว์ป่า เป็นพาหะนำไวรัสที่เริ่มเป็นได้กับสัตว์เมื่อถูกตัวคนหรือสุนัข เช่น ชวนี กวางแดง กวางลม นกทูแคนที่อยู่ในสุนัข และแมวหลายชนิด แมวหลายชนิดช่วยเลี้ยงคือโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกตัวที่เป็นโรคนี้พิษจะค่อยๆ หรือเข้าทางผิวหนังกับบาดแผล เมื่อถูกกัด เมื่อถูกข่วน เช่นถูกมือ หรือมีบาดแผลบนมือ โดนเชื้อจะเข้าไปในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมว จะพบว่าเมื่อโรคพิษสุนัขบ้า จะมาที่น้ำลาย ตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ 1-7 วัน



อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่มักมีอาการโรคนี้ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน แต่บางครั้งมีระยะฟักตัวสั้นมาก ไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานกว่า 1 ปี อาการเริ่มแรก คือ เบื่ออาหาร เวียนศีรษะ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันตามผิวหนังเมื่อถูกกัด แล้วตามไปส่วนอื่น การเสียชีวิตภายใน 6-16 วัน โดยพบเมื่อเริ่มมีอาการแสดงของโรคประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากเริ่มมีอาการ



อาการที่พบในสุนัข

พบในสุนัขที่โดนกัดโดยสุนัขหรือตัวอื่น โดยอยู่ในช่วง 3-8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และพบอาการใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ จะมีไข้และขู่เหวี่ยง และหลบซ่อน โดยจะมีวัน 3-7 วัน

- ระ-๑-๑๕๓๓** สุนัขจะมีอาการแสดงเมื่อมีไข้หรือมีน้ำลายเป็น
- ระ-๑-๑๕๓๓** สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท การแสดงอาการ เดินเหินผิดปกติ ไม่สู้รบ ถิ่นหรือที่ซ่อนไม่เรียบร้อย มีน้ำลายขุ่นขาว
- ระ-๑-๑๕๓๓** สุนัขมีอาการทางประสาท เริ่มมีลมบ้าหมูหรืออาการชัก น้ำลายไหล ขนลุกและอาจมีอาการไอหรือจาม อาจมีอาการ ชวน้ำ โคน้ำไม่ยอม ดื่มน้ำหรือที่ใส่ของตามกรงและอาจมีไข้สูง

5 ปี กักกันสุนัขกัด

- ย1** ล้างแผล สุนัขกัดให้เร็ว
- ย2** ล้างแผล ล้างน้ำ ล้าง หรือ สักให้ถูกวิธี
- ย3** ล้างแผลสุนัขที่กัดให้เร็วกับตัวที่โดนกัด
- ย4** ล้างแผล ล้างน้ำ ล้าง หรือ สักให้ถูกวิธี
- ย5** ล้างแผลสุนัขที่กัดให้เร็วกับตัวที่โดนกัด

กรม สปช
166-167766
กรมสัตวแพทย์
พญาบุรุษโรตารี 166-167766